УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

1. Посещение леса
Клещ сидит на траве или деревьях
Не может летать или прыгать
Может цепляться за жертву
Может упасть на нее
2. Занесение клещей животными (собаками, кошками после прогулки)
3. Занесение клещей людьми на одежде, с цветами, ветками

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

Укус клеща
Раздавливание клеща и втирание при удалении присосавшегося клеща
Употребление в пищу сырого инфицированного козьего или коровьего молока

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Ношение в лесу специальной одежды
2. Регулярное осматривание друг друга
3. Использование репеллентов
4. Пить только кипяченое молоко
5. Сделать прививку
Прививки проводятся круглогодично. Схема вакцинации 2 прививки с интервалом 1-5 мес., ревакцинация через год, затем регулярное проведение ревакцинаций каждые 3 года.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ

Энцефалит- вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА - клещ

Среда обитания: в лесах, на полянах, в парках и других местах, где имеется трава и кусты

Активность:

Теплое время года, с апреля по сентябрь, пик активности май-июль

Как нападает:

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяет со слюной анестезирующее и разжижающее кровь вещество, обезболивающее процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепленного клеща

Через несколько часов после укуса голова насекомого полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от крови

Вирус сохраняется в течение всей жизни клеща!

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Инкубационный период длится 1,5-2 недели
2. Поражение коры головного мозга длится несколько дней
3. Воспаление мозга (симптомы: головные боли, рвота, потеря сознания, температура тела 39-40)

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

1. Необходимо своевременно и осторожно извлечь клеща самостоятельно либо обратиться в лечебное учреждение
2. Обязательно продезинфицировать место укуса после удаления спиртом или раствором йода
3. Тщательно вымойте руки с мылом
4. Клеща необходимо исследовать на наличие инфекции в Центр гигиены и эпидемиологии в г. Красноуфимске ул. Советская 13, либо п. Арти ул. Козлова 4 (Для этого поместить клеща в стеклянный флакон с плотно закрывающейся крышкой.)
5. Для решения вопроса о постановке иммуноглобулина необходимо обратиться в СМП п. Арти к дежурному врачу
6. **Использование иммуноглобулина после укуса не является высокоэффективным средством профилактики. Назначается иммуноглобулин только при отсутствии вакцинации и положительного результата исследования клеща**